

## PRINCIPALES CONFUSIONS.

### TABLEAU COMPARATIF

tableau 1

	<b>Amanite des Césars</b>	<b>Amanite tue-mouches</b>
comestibilité	excellente	toxique
Chapeau	nu ; orangé rouge	orangé-rouge, recouvert d'écailles que la pluie peut faire disparaître
Pied	jaune	blanc
Lames	jaunes	blanches
Anneau	jaune	blanc
volve	ample, tenace, en sac	friable, en bourrelet écailleux ou floconneux

tableau 2

	<b>Amanite rubescens</b>	<b>Amanite panthère</b>
comestibilité	bonne	toxique
Chapeau	blanc rosissant à brun vineux flocons grisâtres	brun-bistre, flocons blancs
marge	non striée	striée
Pied	blanc rosé	blanc, immuable
Lames	blanches tachetées de rose vineux	blanches, serrées
Anneau	ample et strié dessus	très souvent au milieu du pied très mince et non strié
volve	floconneuse fugace	circoncise avec bourrelets hélicoïdaux
chair	rougissante dans les blessures	blanche, immuable

tableau 3

	<b>Coprin Chevelu</b>	<b>Coprin noir d'encre</b>
comestibilité	très bonne	toxique avec des boissons alcoolisées
Chapeau	blanc rosissant puis noircissant à partir de la marge	Gris, brun gris. Revêtement glabre ou "ridulé".
Pied	blanc grisâtre, fibrilleux	blanc, lisse
lames	blanches, rose, puis noires déliquescence	serrées blanches, puis brun pourpre déliquescence
Anneau	mince et mobile	
chair	blanche	noircissante

tableau 4

	<b>Tricholome St Georges</b>	<b>entolome livide</b>
comestibilité	bonne	toxique
Chapeau	blanc, crème, mât, glabre, convexe, bombé	crème ochracé, à nuances grisâtres lisse à ridulé (vergeté).
marge	enroulée	enroulée
Pied	blanc, trapu, cylindrique	blanc à crème, fibrileux, cylindrique
Lames	serrées, blanc crème, échancrées	peu serrées, jaunâtres devenant rose, échancrées
odeur	de farine	de farine

tableau 5

	<b>Clitopilus Prunulus, Meunier</b>	<b>Clitocybe Blanc</b>
comestibilité	bonne	toxique
Chapeau	blanc, blanchâtre, grisâtre au centre, revêtement mât subvelouté	blanc givré, zoné de taches imbues, blanchâtres ochracées, plat
marge	enroulée	
Pied	concolore au chapeau, lisse, cylindrique	blanc, ochracé vers la base
Lames	blanches puis roses à maturité décurrentes	blanches, adnées à décurrentes
odeur	de farine	de farine ou aromatique

tableau 6

	<b>Chanterelle, Girolle</b>	<b>Clitocybe de l'olivier</b>
comestibilité	excellente	très toxique
Chapeau	jaune d'oeuf, orangé ou pâissant, lisse, convexe, puis irrégulièrement déprimé	orangé vif au début, se ternit de brun-rougeâtre en vieillissant, phosphorescent
Pied	concolore au chapeau	lisse, subconcolore
Lames	plis épais, fourchus, concolores au chapeau	décurrentes, fines, serrées, subconcolores
chair	pâle, goût agréable	pâle, ferme
odeur	fruitée	

tableau 7

	Agaric silvaticus	Agaric radicaant
comestibilité	excellente	toxique
Chapeau	squames serrées brun roux sur fond plus clair, peu charnu	squames brunes souvent étalées en étoile sur fond blanchâtre
Pied	blanc à gris rosâtre, beige sale, élargi vers la base, légèrement bulbeux	un peu bulbeux, blanchâtre, brunissant à cordonnnet radicifonne blanc
Lames	rose gris à brun gris	rosé vif puis brun sale
anneau	fragile	fragile
chair	blanche à rosissement vineux pâle	blanche à brun rosâtre, orangée vers le bas
odeur	agréable	agréable

tableau 8

	Tricholome pretentieux	Tricholome petit gris
comestibilité	excellente	bonne
Chapeau	revêtement fibrileux gris ardoise sur fond légèrement jaune, mamelonné, plus ou moins lisse	gris noirâtre fibrillo-vergeté, convexe conique plus ou moins étalé
Pied	trapu, cylindrique, blanc à reflets jaunes	blanc, fibrileux, lisse, cylindrique
Lames	blanches jaune pale (reflets citrins) échancrées	peu serrées, grisâtres, échancrées
chair	blanche, jaune léger en surface goût de farine	blanche
odeur	farine, huitre	faible non farineuse

tableau 9

	Russule charbonnière	Russule verdoyante	Amanite phalloïde
comestibilité	excellente	excellente	Mortelle
Chapeau	couleurs variées (vert, bleu violacé) cuticule lisse vergetée et luisante de 12 à 25 cms	cuticule veloutée et craquelée, vert bleuté ou vert de gris sur fond blanchâtre	vert jaunâtre à vert bronzé, reste de voile général rare. Vergeté radialement de grisâtre
Pied	blanc cylindrique, grenu se cassant comme de la craie	blanc cylindrique, grenu se cassant comme de la craie	blanc, chiné ou zébré de gris olivâtre
Lames	blanches à consistance lardacées flexibles	Blanches	Blanches, serrées et libres
anneau	sans	sans	blanc membraneux
volve	sans	sans	blanche en sac blanc pur
chair	blanche cassante	blanche à goût de noisette, cassante	blanche, fibreuse
odeur			odeur de rose en vieillissant

tableau 10

	Lépiote élevée	Lépiote deguenillée	Petites lépiotes	Lépiote Venenata
comestibilité	excellente	excellente	Mortelle	+ ou - toxique
Chapeau	Calotte charnue discale mamelonnée brune et squames réguliers, circulaires brunâtres, 12 à 25 cms	Calotte (disque central) et grosses écailles retroussées concentriques beiges brunâtres, de 10 à 15 cms	de diamètre inférieur à 10 cms fragile	espèce charnue, calotte discale brune squames dilacérées en étoile brun rougeâtre sombre sur fond crème de 15 à 30 cms
Pied	Chiné sur fond pâle, un peu bulbeux, 2 à 3 cms	blanc crème, lisse, très bulbeux, de 1 à 2 cms	mince, inférieur à 1 cm	blanc lisse ou prumineux, massif à bulbe énorme de 2 à 5 cms
Lames	blanc crème, libres	libres, blanc crème, salies au toucher	blanches	blanc sale, se salissant de rosé terne
anneau	épais , double	épais , double	fragile plus ou moins fugace	simple
chair	pâle	pâle à rougissement orangé	pâle	épaisse à rougissement vineux
odeur	sans	sans	variables	sans

tableau 11

	Tricholome Tigré	Tricholome Jossierandii	Tricholome virgatum	Tricholome sciodes
comestibilité	toxique	toxique	mauvais goût	mauvais goût
Chapeau	gris ochracé, squames concentriques larges brun noirâtre sur fond pâle	sublisse à vergeté, grisâtre pâle parfois argenté à beige blanchâtre	conique, fibrilleux, vergeté à la fin d'un gris pâle argenté puis plombé	conique, fibrilleux, vergeté à la fin d'un gris pâle argenté puis plombé
Pied	robuste, clavé, sublisse, blanchâtre	atténué vers le bas blanchâtre a base roussâtre ou rosée	fibrineux, pâle ou rosé base subbulbeuse parfois tronquée	fibrilleux, pâle ou rosé base subbulbeuse parfois tronquée
Lames	blanchâtres à reflets glauques, épaisses, larges	blanches ou à reflets glauques peu serrées	à reflets gris blanchâtre, peu larges	peu régulières, gris blanchâtre, ventruées
chair	blanchâtre, saveur douceâtre	blanchâtre, saveur désagréable	blanche grisâtre saveur amère puis vite acre	blanche grisâtre saveur amère
odeur	un peu farineuse puis désagréable	farine rance		

tableau 12

	Agaric des jachères	Rosé des prés	Agaric jaunissant	Amanites Blanches
comestibilité	excellente	excellente	toxique	mortelles
Chapeau	blanc jaunissant au froissement cuticule lisse soyeuse	blanc à blanchâtre, légèrement ochracé avec l'âge	blanc, jaunissement vif au froissement de la marge en particulier	blanc
Pied	blanc cylindrique,	enroulée	blanc jaunissant	blanc
Lames	gris rosé à brun	blanc, fusiforme atténué vers la base	rose vif puis brun chocolat, libres	blanches
anneau	épais à roue dentée	libres, serrées, rosé vif puis bistres	à roue dentée	blanc
volve	sans	cotoneux, fragile	sans	en sac
chair	blanche	blanchâtre un peu rosissante goût agréable	blanche jaunissant fortement vers la base	blanche
odeur	anisée	sans	iodée ou d'encre	